



TUL



در منزل، بعد از عمل جراحی

- ۱- مایعات فراوان بنوشید
- ۲- آتش پیوستگی و ممکن مایعات تجویز شده توسط پزشک، دقیقاً طبق دستور استفاده گردد.
- ۳- تا یک هفته از فعالیت شدید بدنی خودداری کنید
- ۴- حتماً در یک طرف ادرار نمایید تا در صورت دفع سنگ، آنرا را جهت انجام آزمایش بدست آورید.
- ۵- در صورت هر گونه مشکل پیش آمده که قبلاً ذکر شده با پزشک معالج تماس گرفته شود.
- ۶- ده روز بعد از سنگ شکنی کوشش مجدد سونوگرافی و رادیولوژی جهت اطمینان از موفقیت کامل سنگ شکنی و دفع کامل سنگ از مجرای ادرار انجام می شود.

در موارد ذیل بعد از سنگ شکنی حتماً پزشک معالج را آگاه نمایید

- ۱- تب و لرز بعد از ترخیص از بیمارستان
- ۲- دردهای سرکش بعد از ترخیص از بیمارستان که ممکن است به علت ردیف شدن سنگ های خرد شده در حالب و یا گیر کردن مجدد قطعه ای بزرگ از سنگ باشد.
- ۳- حالت تهوع و استفراغ شدید و غیرقابل کنترل بعد از عمل که به علت عفونت و یا گیر کردن مجدد سنگ می باشد
- ۴- بندرت خونریزی های خیلی شدید بدنیاال سنگ شکنی حالب اتفاق می افتد
- ۵- بند آمدن ادرار (رانسیون ادراری) که بندرت اتفاق می افتد.

توضیح کلیه یک بیماری با درد شدید پهلو بوده که بعلت گیر کردن سنگ ادراری در لوله حالب و بدنبال آن انسداد و تورم کلیه می باشد. در اکثر موارد سنگ های کوچک حالب با تجویز مسکن خود بخود دفع می شوند ولی در مواردی که سنگها بزرگتر باشند، می توان از طریق روش TUL از راه مجرا، بدون هیچگونه برشی و بی صیج دردی سنگ را خارج نمود.



عمل جراحی TUL

جراح به کمک وسیله ای بنام یورتروسکوپ از طریق مجرای ادرار وارد مثانه و سپس لوله حالب شده و بعد از دیدن سنگ به کمک ابزار مخصوص سنگ را خرد نموده و در این مرحله در صورتی که امکان داشته باشد خرده های سنگ خارج شده و در غیر این صورت بسته به نظر جراح ممکن است در داخل لوله حالب لوله ای قرار داده شود که چند روز بعد از عمل TUL خارج خواهد شد.

نکاتی که باید بعد از سنگ شکنی حالب رعایت گردد

۱- بعد از خارج کردن سوند حالبی گاهی دردهایی بعلت عبور قطعات شکسته شده سنگ و یا تورم حالب بعلت دستکاری ضمن عمل بوجود می آید، که با استفاده از مسکن مناسب درد کاهش می یابد.

- ۲- تا چند روز بعد از سنگ شکنی حالبی ممکن است شاهد کاهش خون در ادرار باشید که احییت ندارد.
- ۳- احساس سوزش داخل مجرای ادراری و تکرر ادرار، به علت التهاب و دستکاری مجرای ادراری ضمن سنگ شکنی و عبور وسیله یورتروسکوپ از مجرا است.
- ۴- از آنتی بیوتیک تجویز شده توسط پزشک معالج طبق دستور پزشک معالج استفاده شود. تا مانع عفونت گردد.
- ۵- مایعات فراوان بنوشید و ادرار را در ظرف جمع آوری و از نظر سنگ ادراری دفع شده کنترل نمایید.

