



واحد آموزش به بیماران

تعریف هیستریکتومی هیستریکتومی (برداشتن

رحم) بعد از سزارین، شایع‌ترین عمل جراحی زنان است؛ بطوری که در آمریکا هر سال ۶۰۰ هزار زن هیستریکتومی می‌شوند. عبارت دیگر، این آمار نشان می‌دهد که در این کشور، حدود یک سوم زنان قبل از رسیدن به سن ۶۰ سالگی، تن به تیغ هیستریکتومی می‌دهند.

علل هیستریکتومی مشکلاتی مثل درد شدید

لگن، خونریزی شدید و نامنظم ماهانه یا ابتلا به سرطان رحم از مواردی هستند که گاه برای درمان آنها چاره‌ای جز خارج کردن رحم از طریق جراحی نیست. البته در اغلب موارد، هیستریکتومی، برای درمان گروهی از بیماری‌های زنان است که به درمان دارویی پاسخ خوبی نداده‌اند. در ضمن، این روش برای خانم‌هایی می‌تواند مطلوب باشد که دیگر قصد بچه‌دار شدن ندارند و از بکاربردن درمان‌های بی‌نتیجه و متعدد خسته شده‌اند. بطور خلاصه مهمترین و شایع‌ترین علل هیستریکتومی یا عمل جراحی برداشتن رحم عبارتند از خونریزی‌های نامنظم رحمی (در سنین بالای ۴۰ سالگی)، افتادگی شدید رحم یا مثانه همراه دردهای شدید لگنی، دردهای لگنی به دلیل وجود واریس یا اختلالات عروقی دیگر در وریدهای لگنی، بدخیمی‌ها یا سرطان‌های رحم، دهانه رحم یا تخمدان‌ها، بیماری آندومتریوز (در این بیماری بافت داخلی رحم در لگن یا روی تخمدان‌ها، لوله‌ها یا روده‌ها رشد می‌کند و موجب دردهای شدید لگنی به خصوص چند روز قبل از شروع قاعدگی می‌شود)، دردهای شدید زمان عادت ماهانه که به درمان‌های دارویی پاسخ نمی‌دهد.

نحوه انجام هیستریکتومی

برای انجام هیستریکتومی، پزشک با عمل جراحی، رحم شما را از لوله‌های تخمدانی، تخمدان‌ها و واژن جدا و خارج می‌کند. البته با توجه به وضع شما، جراحی ممکن است شامل خارج کردن بافت‌ها و ارگان‌های اضافی‌تر نیز باشد. بطور کلی هیستریکتومی می‌تواند با برشی در روی شکم یا از طریق واژن صورت بگیرد. انجام هیستریکتومی از طریق لاپاروسکوپی نیز روش جدید و خوبی است. در این روش، یک برش خیلی کوچک در قسمت تحتانی شکم برای وارد کردن دستگاه لاپاروسکوپ ایجاد می‌شود که به تیم جراحی اجازه دیدن داخل شکم، برش و خارج کردن رحم را می‌دهد.

معمولا برای انجام هیستریکتومی، باید بیمار تحت بیهوشی عمومی قرارگیرد. خود عمل حدود ۱ تا ۲ ساعت طول می‌کشد. بعد از عمل در بخش بستری شده و در صورت لزوم، برای کاهش درد و جلوگیری از عفونت، داروهایی به شما می‌دهند. روز بعد از عمل شما می‌توانید بلند شده و راه بروید. در زمانیکه در بیمارستان هستید، برای بهبود جریان خون و جلوگیری از ایجاد لخته در پاها، لازم است قدم زدن‌های کوتاه و متعددی داشته باشید. بعد از جراحی به دلیل خونریزی‌های واژن و ترشحات برای مدتی نیاز به نوار بهداشتی خواهیدداشت که بطور طبیعی تا چند روز بعد از عمل طول خواهدکشید. بعد از عمل جراحی تقریبا ۴-۶ هفته طول می‌کشد تا به وضعیت طبیعی خود بازگردید.

مراقبت‌های پس از برداشتن رحم

می‌توانید پس از گذشت ۳ روز از عمل استحمام کنید. پانسمان خود را برداشته. ناحیه عمل را با آب و شامپوی بچه به ملایمت بشویید و بعد از استحمام محل عمل را خوب خشک کرده و یک گاز استریل خشک روی ناحیه عمل بگذارید از انجام کارهای سنگین یا برداشتن وسایل سنگین حداقل به مدت دو ماه خودداری کنید. پیاده‌روی برای شما مفید است. ده روز بعد از عمل با گرفتن جواب نمونه جهت کشیدن بخیه‌ها و کنترل ناحیه عمل به پزشک معالج خود مراجعه کنید. با کنترل محل عمل، در صورت مشاهده هرگونه ترشح، سفتی و کبودی محل عمل، پزشک خود را مطلع کنید.

۲. خونریزی به مقدار کم بعد از عمل، طبیعی است. در صورت افزایش مقدار و حجم خونریزی حتماً پزشک خود را مطلع کنید.

۳. با مراجعه به پزشک حتماً از داروهای تجویز شده استفاده کنید.

اگر در طی عمل تخمدان‌های شما نیز برداشته شده باشد، می‌توانید درباره کنترل علائم **یائسگی** با پزشکتان مشورت کنید. اگر تخمدان‌های شما زیر ۴۵ سالگی برداشته شده باشد، خطر پوکی استخوان شما را تهدید می‌کند. از پزشک خود بخواهید برنامه‌ای برای جلوگیری از پوکی استخوان به شما ارائه کند. بعد از ۶ هفته از زمان عمل، شما می‌توانید فعالیت جنسی خود را آغاز کنید و برداشتن رحم هیچ اختلالی در این زمینه ایجاد نخواهد کرد.